Аурика Луковкина

Высшая математика. Шпаргалка

Аурика Луковкина

Высшая математика. Шпаргалка

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9094493
Высшая математика. Шпаргалка: Научная книга; 2009

Аннотация

Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и успешно их сдать.

Содержание

1. Основные понятия. Системы координат. Прямые линии и их взаимное расположение 4
2. Условие нахождения трех точек на одной прямой. Уравнение прямой. Взаимное расположение точек и прямой. Пучок прямых. Расстояние от точки до прямой 8
3. Полярные параметры прямой. Нормальное уравнение прямой. Преобразование координат 12
4. Порядок алгебраических линий. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола 16
5. Аналитическая геометрия в пространстве. Плоскость 20
6. Прямая в пространстве 24
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Высшая математика. Шпаргалка

1. Основные понятия. Системы координат. Прямые линии и их взаимное расположение

Координата точки – это величина, определяющая положение данной точки на плоскости, на прямой или кривой линии или в пространстве. Значение координаты зависит от выбора начальной точки, от выбора положительного направления и от выбора единицы масштаба.

Прямоугольная система координат состоит из двух взаимно перпендикулярных прямых – осей, точка их пересечения – **начало координат** O, ось OX – **ось абсцисс**, ось OY – **ось ординат**. На осях выбираются масштаб и положительное направление.



Рис. 1

Системы координат

Положение точки M определяется двумя координатами: абсциссой x и ординатой y. Записывается так: $M(x, y)$. Оси координат образуют четыре координатных угла I, II, III, IV. Если точка находится в I координатном угле (квадранте), то и абсцисса, и ордината ее положительные, если – во II квадранте, то абсцисса отрицательна, а ордината положительна, если в – III квадранте, и абсцисса, и ордината отрицательны, если – в IV квадранте, положительна абсцисса, а ордината отрицательна. У точки, лежащей на оси ординат, абсцисса равна нулю, и наоборот, если точка лежит на оси абсцисс, то ее ордината равна нулю.

Косоугольной системой координат аналогична прямоугольной, только оси координат пересекаются под углом не равным прямому. Прямоугольная и косоугольная системы относятся к **декартовой системе координат**.

Полярная система координат состоит из полюса O и

полярной оси OX, проведенной из полюса. Положение точки определяется полярным радиусом ϱ (отрезок OM) и **полярным углом** φ. Для полярного угла берется его **главное значение** (от $-\pi$ до π). Числа ϱ, φ называются **полярными координатами** точки M.

Связь между координатами точки в прямоугольной и полярной системах координат: $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ или:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \cos\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\sin\varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, tg\varphi = \frac{x}{y}.$$

Пусть имеются две точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$. **Расстояние между точками:**

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1) + (y_2 + y_1)}.$$

Общее уравнение прямой линии (система координат

прямоугольная): $Ax + By + C = 0$ (A и B одновременно не равны нулю).

Если B не равно нулю, то уравнение прямой: $y = ax + b$ (здесь $a = -A / B$, $b = -C / B$). Здесь a есть тангенс угла наклона прямой к положительному направлению оси абсцисс, b равно длине отрезка от начала координат до точки пересечения рассматриваемой прямой с осью ординат. Уравнение прямой, параллельной оси абсцисс: $y = b$, уравнение оси абсцисс: $y = 0$; уравнение прямой, параллельной оси ординат: $x = c$, уравнение оси ординат: $x = 0$.

2. Условие нахождения трех точек на одной прямой. Уравнение прямой. Взаимное расположение точек и прямой. Пучок прямых. Расстояние от точки до прямой

1. Пусть даны три точки A_1 (x_1, y_1), A_2 (x_2, y_2), A_3 (x_3, y_3), тогда **условие нахождения их на одной прямой**:

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = 0$$

либо $(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) = 0$.

2. Пусть даны две точки A_1 (x_1, y_1), A_2 (x_2, y_2), тогда у**равнение прямой, проходящей через эти две точки**:

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x \quad - x_1 & y \quad - y_1 \end{vmatrix} = 0$$

$(x_2 - x_1)(y - y_1) - (x - x_1)(y_2 - y_1) = 0$ или $(x - x_1) / (x_2 - x_1) = (y - y_1) / (y_2 - y_1)$.

3. Пусть имеются точка M (x_1, y_1) и некоторая прямая L, представленная уравнением $y = ax + c$. **Уравнение прямой, проходящей параллельно данной прямой *L* через данную точку *M*:**

$y - y_1 = a(x - x_1)$.

Если прямая L задана уравнением $Ax + By + C = 0$, то параллельная ей прямая, проходящая через точку M, описывается уравнением $A(x - x_1) + B(y - y_1) = 0$.

Уравнение прямой, проходящей перпендикулярно данной прямой *L* через данную точку M:

$y - y_1 = -(x - x_1) / a$

или

$a(y - y_1) = x_1 - x$.

Если прямая L задана уравнением $Ax + By + C = 0$, то параллельная ей прямая, проходящая через точку $M(x_1, y_1)$, описывается уравнением $A(y - y_1) - B(x - x_1) = 0$.

4. Пусть даны две точки A_1 (x_1, y_1), A_2 (x_2, y_2) и прямая, заданная уравнением $Ax + By + C = 0$. **Взаимное расположение точек относительно этой прямой:**

1) точки A_1, A_2 лежат по одну сторону от данной прямой, если выражения $(Ax_1 + By_1 + C)$ и $(Ax_2 + By_2 + C)$ имеют одинаковые знаки;

2) точки A_1, A_2 лежат по разные стороны от данной прямой, если выражения $(Ax_1 + By_1 + C)$ и $(Ax_2 + By_2 + C)$ имеют разные знаки;

3) одна или обе точки A_1, A_2 лежат на данной прямой, если одно или оба выражения соответственно $(Ax_1 + + By_1 + C)$ и $(Ax_2 + By_2 + C)$ принимают нулевое значение.

5. **Центральный пучок** – это множество прямых, проходящих через одну точку $M(x_1, y_1)$, называемую **центром пучка**. Каждая из прямых пучка описывается уравнением пучка $y - y_1 = \kappa(x - x_1)$ (**параметр пучка** κ для каждой прямой свой).

Все прямые пучка можно представить уравнением: $l(y - y_1) = m(x - x_1)$, где l, m – не равные одновременно нулю произвольные числа.

Если две прямые пучка L_1 и L_2 соответственно имеют вид $(A_1x + B_1y + C_1) = 0$ и $(A_2x + B_2y + C_2) = 0$, то уравнение пучка: $m_1(A_1x + B_1y + C_1) + m_2(A_2x + B_2y + C_2) = 0$. Если прямые L_1 и L_2 пересекающиеся, то пучок центральный, если прямые параллельны, то и пучок параллельный.

6. Пусть даны точка $M(x_1, y_1)$ и прямая, заданная уравнением $Ax + By + C = 0$. **Расстояние** d **от** этой **точки** M **до прямой**:

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|.$$

3. Полярные параметры прямой. Нормальное уравнение прямой. Преобразование координат

Полярными параметрами прямой L будут **полярное расстояние** p (длина перпендикуляра, проведенного к данной прямой из начала координат) и **полярный угол** α (угол между осью абсцисс OX и перпендикуляром, опущенным из начала координат на данную прямую L). Для прямой, представленной уравнением $Ax + By + C = 0$: полярное расстояние

$$p = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

полярный угол α

$$\cos\alpha = \mp\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \sin\alpha = \mp\frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

причем при $C > 0$ берется верхний знак, при $C < 0$ – нижний знак, при $C = 0$ знаки берутся произвольно, но либо оба плюса, либо оба минуса.

Нормальное уравнение прямой (уравнение в полярных параметрах) (см. рис. 2): $x \cos\alpha + y \sin\alpha - p = 0$. Пусть прямая представлена уравнением вида $Ax + By + C = 0$. Чтобы данное уравнение привести к нормальному виду необходимо последнее разделить на выражение $\mp\sqrt{A^2 + B^2}$ (знак берется в зависимости от знака C).



Рис. 2

После деления получается нормальное уравнение данной прямой:

$$\mp\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}x\mp\frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}y-\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=0.$$

Пусть имеется прямая L, которая пересекает оси координат. Тогда данная прямая может быть представлена **уравнением в отрезках** $x / a + y / b = 1$. Справедливо: если прямая представлена уравнением $x / a + y / b = 1$, то она отсекает на осях отрезки a, b.

Преобразование координат возможно путем переноса начала координат, или поворотом осей координат, или совместно переносом начала и поворотом осей.

При **переносе начала координат** справедливо следующее правило: старая координата точки равна новой, сложенной с координатой нового начала в старой системе. Например, если старые координаты точки M были x, y, а координаты нового начала в старой системе $O^*(x_0, y_0)$, то координаты точки M в новой системе координат с началом в точке O^* будут равны $x - x_0$, $y - y_0$ т. е. справедливо следующее $x = x^* + x_0$, $y = y^* + y_0$ или $x^* = x - x_0$, $y^* = y - y_0$ (* новые координаты точки).

При **повороте осей** на некоторый угол φ справедливы следующие формулы (где x, y – старые координаты точки; x^*, y^* – новые координаты этой же точки):

$x = x^* \cos\alpha - y^* \sin\alpha$;

$y = x^* \sin\alpha + y^* \cos\alpha$

или

$x^* = x \cos\alpha + y \sin\alpha;$

$y^* = -x \sin\alpha + y \cos\alpha.$

4. Порядок алгебраических линий. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола

Линия L, представленная в декартовой системе уравнением n–степени называется **алгебраической линией n–порядка**.

Окружность с радиусом R и центром в начале координат описывается уравнением: $x^2 + y^2 = R^2$, если центром окружности является некоторая точка $C\ (a,\ b)$, то уравнением:

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Чтобы уравнение $Ax^2 + Bx + Ay^2 + Cy + D = 0$ описывало окружность, необходимо, чтобы оно не содержало члена с произведением xy, чтобы коэффициенты при x^2 и y^2 были равны, чтобы $B^2 + C^2 - 4AD > 0$ (при невыполнении данного неравенства уравнение не представляет никакой линии).

Координаты центра окружности, описанной уравнением $Ax^2 + Bx + Ay^2 + Cy + D = 0$ и ее радиус: $a = -B / 2A$, $b = -C / 2A$, $R^2 = (B^2 + C^2 - 4AD) / 4A^2$.

Эллипс – сжатая окружность (рис. 3).



Рис. 3

Прямая AA_1 называется **осью сжатия**, отрезок $AA_1 = 2a$ **– большой осью эллипса,** отрезок $BB_1 = 2b$ **– малой осью эллипса** ($a > b$) точка O **– центром эллипса**, точки A, A_1, B, B_1 **– вершинами эллипса**. Отношение $k = b / a$ **коэффициент сжатия** величина $\alpha = 1 - k = (a - b) / a$ **– сжатие эллипса**. Эллипс обладает симметрией относительно большой и малой осей и относительно своего центра.

Каноническое уравнение эллипса: $x^2 / a^2 + y^2 / b^2 = 1$.

Другое определение эллипса: эллипс есть геометрическое место точек (M), сумма расстояний которых до двух данных точек F, F_1 имеет одно и то же значение $2a$ ($F_1M + FM = 2a$) (рис. 4).



Рис. 4

Точки F и F_1 называются **фокусами эллипса**, а отрезок FF_1 – **фокусным расстоянием**, обозначается $FF_1 = 2c$, причем $c < a$. Эксцентриситет эллипса ε – это отношение фокусного расстояния к большой оси $\varepsilon = c / a$. Эксцентриситет эллипса меньше единицы, имеем: $k^2 = 1 - \varepsilon^2$.

Гипербола – это геометрическое место точек, разность расстояний которых до двух данных точек F, F_1 имеет одно и то же абсолютное значение (рис. 5). $|F_1M - FM| = 2a$. Точки F, F_1 называются **фокусами гиперболы**, расстояние $FF_1 = 2c$ – **фокусным расстоянием**. Справедливо: $c > a$.

Каноническое уравнение гиперболы: $x^2 / a^2 + y^2 / (a^2 - c^2) = 1$. Асимптоты гиперболы заданы уравнениями $y = bx / a$ и $y = - bx / a$ ($b^2 = c^2 - a^2$).

Парабола – это геометрическое место точек равноудаленных от данной точки F **(фокуса параболы)** и данной прямой PQ **(директрисы параболы)**. Расстояние от фоку-

са до директрисы FC называется **параметром параболы** и обозначается p. Вершина параболы – точка O. Каноническое уравнение параболы: $y^2 = 2px$.



Рис. 5

5. Аналитическая геометрия в пространстве. Плоскость

Всякая поверхность в пространстве определяется уравнением вида $f(x, y, z) = 0$.

Общее уравнение плоскости: $Ax + By + Cz + D = 0$. Если A, B, C, D не равны нулю, то уравнение называется **полным**.

При $D = 0$ уравнение $Ax + By + Cz = 0$ определяет плоскость, проходящую через начало координат.

Если $A = 0$, то уравнение определяет плоскость, параллельную оси Ox. Если два из коэффициентов A, B, C равны нулю одновременно, то уравнение определяет плоскость, параллельную одной из координатных плоскостей: при $A = 0$ и $B = 0$ параллельно плоскости xOy, при $A = 0$ и $C = 0$ параллельно xOz, при $B = 0$ и $C = 0$ параллельно yOz. Уравнение $Cz = 0$ определяет плоскость xOy, $By = 0$ – плоскость xOz, $Ax = 0$ – плоскость yOz. Уравнение плоскости в «отрезках»: $x / a + y / b + z / c = 1$. Расстояние от точки $M(x_1, y_1, z_1)$ до плоскости:

$$d = \frac{\left| Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D \right|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Пусть имеются две плоскости $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Угол φ между этими плоскостями:

$$\cos\varphi = \pm \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

Условие равенства двух плоскостей: $A_1 / A_2 = B_1 / B_2 = C_1 / C_2 = D_1 / D_2$. Условие параллельности плоскостей: $A_1 / A_2 = B_1 / B_2 = C_1 / C_2$. Условие перпендикулярности плоскостей: $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку M (x_1, y_1, z_1) параллельно плоскости, заданной уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$: $A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) + D = 0$. Уравнение плоскости, проходящей через три точки M_1 (x_1, y_1, z_1), M_2 (x_2, y_2, z_2), M_3 (x_3, y_3, z_3):

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ x-x_3 & y-y_3 & z-z_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Уравнение плоскости, проходящей через две точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$ перпендикулярно к плоскости, заданной уравнением $A_x + B_y + C_z + D = 0$:

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0.$$

Уравнение плоскости, проходящей через точку M_1 (x_1, y_1, z_1) перпендикулярно двум непараллельным плоскостям $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, имеет вид:

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Имеем три плоскости, заданные общими уравнениями:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0; \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0; \\ A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0. \end{cases}$$

6. Прямая в пространстве

Всякая прямая определяется в пространстве системой двух уравнений

$$\begin{cases} f_1(x,y,z)=0; \\ f_2(x,y,z)=0. \end{cases}$$

Канонические (симметричные) уравнения прямой: $(x - x_0) / m = (y - y_0) / p = (z - z_0) / q$, прямая проходит через точку M_0 (x_0, y_0, z_0). Угол φ между двумя прямыми, заданными каноническими уравнениями:

$$\cos\varphi = \frac{m_1 m_2 + p_1 p_2 + q_1 q_2}{\sqrt{m_1^2 + p_1^2 + q_1^2}\sqrt{m_2^2 + p_2^2 + q_2^2}}.$$

Условие параллельности двух прямых: $m_1 / m_2 = p_1 / p_2 = q_1 / q_2$. Условие перпендикулярности двух прямых: $m_1 m_2 + p_1 p_2 + q_1 q_2 = 0$.

Пусть имеются прямая $(x - x_0) / m = (y - y_0) / p = (z - z_0) /$

q и плоскость $Ax + By + Cz + D = 0$. Условие параллельности прямой и плоскости: $Am + Bp + Cq = 0$. Условие перпендикулярности прямой и плоскости: $A / m = B / p = C / q$. Условие принадлежности прямой плоскости:

$$\begin{cases} Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0; \\ Am + Bp + Cq = 0 \end{cases}$$

Если прямая задана параметрически x

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.